




CHROMOS AGRO SAVJETUJE

Zimsko prskanje voćaka i vinove loze



Zimsko prskanje voćaka i vinove loze, tzv. plavo prskanje bakrenim preparatima glavna je preventivna mjera zaštite kojom suzbijamo čitav niz bolesti voćaka i vinove loze u vrijeme mirovanja i prije samog kretanja vegetacije. Tvrtka CHROMOS AGRO iz svoje palete nudi preventivni kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja CUPRABLAU-Z. Spomenut ćemo samo najznačajnije u čitavom nizu bolesti koje se zimskim prskanjem suzbijaju u ovom razdoblju:

Primjenom fungicida Cuprablau-Z u koncentraciji 0,8% suzbijamo ekonomski najznačajnije bolesti koštičavih voćaka koje prezimljuju na grančicama, kori ili ispod ljuskica pupova zaraženih voćaka, a to su:

- kovrčavost lista breskve (*Taphrina deformans*)
- šupljikavost lišća koštičavih voćaka (*Clasterosporium carpophilum*)
- rogač šljive (*Taphrina pruni*).

Preporučuje se obaviti prskanje već u jesen nakon opadanja lišća ili dva puta tijekom zime najkasnije do početka vegetacije.

CUPRABLAU-Z kod jezgričavih voćaka suzbija krastavost jabuke i kruške (*Venturia spp.*). Uzročnik bolesti prezimljuje na kori i otpalom lišću. Preporučuje se prskanje od faze mirovanja do pojave mišjih ušiju u koncentraciji 0,5-0,8%. Na vinovoj lozi preporučuje se primijeniti CUPRABLAU-Z u fazi mirovanja vegetacije do faze vunastog pupa u koncentraciji 0,8-1% za suzbijanje crne pjegavosti vino-

ve loze (*Phomopsis viticola*). Simptomi ove bolesti mogu se uočiti vrlo lako na zaraženim mladima vinove loze koje poprimaju sivkastu boju i prekrivene su mnogobrojnim crnim točkicama (plodna tijela gljive).

Na lupinastom voću (orah, lijeska) CUPRABLAU-Z preventivno štiti od bakterioza (*Xanthomonas spp.*) koje mogu uzrokovati velike štete stvaranjem rak-rana na granama iz kojih se tijekom vegetacije pojavljuju karakteristični žuti eksudat.

Preporučujemo prskanje obaviti u jesen nakon berbe i prije kretanja vegetacije u koncentraciji od 0,5%.

Na maslini se preporučuje primijeniti CUPRABLAU-Z u jesen ili u rano proljeće, najkasnije do cvatnje, za suzbijanje paunova oka

(*Spilocaea oleagina*) u koncentraciji od 0,3%.

Kod plavog prskanja vrlo je bitna kvaliteta prskanja, tj. voćke i vinovu lozu potrebno je dobro oprskati sa svih strana i doslovno ih „okupati“ otopinom, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore.

Za istodobno suzbijanje štetnika koji prezimljuju na i pod korom voćaka i vinove loze (jaja crvenoga voćnog pauka, zimska jaja lisnih uši) preparatu Cuprablau-Z potrebno je dodati i mineralno ulje.

Redovnim provođenjem zimskog prskanja voćaka i vinove loze preparatom Cuprablau-Z značajno smanjujemo kasniju jaču pojavu ovih bolesti u vegetaciji.

ANTE GRUBIŠIĆ, DIPL.ING.